

ЭНТРОМИН-SN[®] 200мл

ЧИСТЫЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ НЕЗАМЕНИМЫЕ И ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ С КСИЛИТОЛОМ

ВЫСОКАЯ ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
ENTROMIN SN

 Under License agreement with;
ROUSSEL MORISHITA CO. LTD.,
Osaka, Japan

В 200 мл препарата содержится	ЗНАЧЕНИЕ
Аминокислоты, в том числе:	21.82 g
незаменимых аминокислот	10.850 g
заменимых аминокислот	10.432 g
соотношение Зам. / Незам. АК	1.04 g
СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА	3.04 g
БЕЛОК С ВЫСОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ	19 g
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ	135 ккал

НЕЗАМЕНИМЫЕ
АМИНО КИСЛОТЫ

ЗАМЕНИМЫЕ
АМИНО КИСЛОТЫ

1:1

БЕЗОПАСНО
ДЛЯ
ДИАБЕТИКОВ

СКОРОСТЬ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ
В начале 15-20 капель/мин до 10 мин.
Далее следует по 30-40 капель/мин.



1. В ХИРУРГИИ, СЕПСИСЕ И ТРАВМАХ

ПОСЛЕДСТВИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО АЗОТИСТОГО БАЛАНСА ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ....

ПОТЕРЯ ЖИДКОСТИ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ТКАНЕЙ
↓
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ АЗОТИСТЫЙ БАЛАНС
↓
СЛАБЫЙ ИММУНИТЕТ
↓
ИНФЕКЦИЯ
↓
ЗАМЕДЛЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ



СЛЕДОВАТЕЛЬНО, КОРРЕКЦИЯ АЗОТИСТОГО
БАЛАНСА ИМЕЕТ ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ХИРУРГИЧЕСКОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО

- ◆ КОРРЕКТИРУЕТ ВЫЗВАННЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ АЗОТИСТЫЙ БАЛАНС
- ◆ УЛУЧШАЕТ БАЛАНС ЧИСТОГО БЕЛКА ЗА 3 ЧАСА И СОХРАНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ
- ◆ СПОСОБСТВУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТКАНЕЙ И УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ
- ◆ ПОМОГАЕТ В БОЛЕЕ БЫСТРОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ

ДОЗИРОВКА:
ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ - 1 ФЛАКОН
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ - 1-2 ФЛАКОНА
В ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ

2. В ЗВГР И ОЛИГОГИДРАМНИОНЕ...

- ◆ АРГИНИН УСИЛИВАЕТ ПЛАЦЕНТАРНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ
- ◆ УЛУЧШАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ АФГ ПРИ МАЛОВОДИИ
- ◆ УЛУЧШАЕТ ВЕС И РОСТ ПЛОДА
- ◆ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЫЧНЫХ ПОСТАВОК БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ

ДОЗИРОВКА:
ЛЕГКАЯ СТЕПЕНЬ - ПО 1 ФЛАКОНУ
В ДЕНЬ В ТЕЧЕНИИ 7 ДНЕЙ
ТЯЖЕЛАЯ СТЕПЕНЬ - ПО 1-2 ФЛАКОНУ
В ДЕНЬ В ТЕЧЕНИИ 7 ДНЕЙ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗДОРОВЫЙ РОСТ ПЛОДА



3. ПАЦИЕНТАМ С ХБП ТРЕБУЕТСЯ ИНФУЗИЯ АМИНОКИСЛОТ

50% ПАЦИЕНТОВ С ТНП

СТРАДАЮТ ОТ БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ОТРИЦАТЕЛЬНОГО АЗОТИСТОГО БАЛАНСА

- ◆ **УЛУЧШАЕТ ЧИСТЫЙ БЕЛКОВЫЙ БАЛАНС**
- ◆ **ВОССТАНАВЛИВАЕТ АЗОТИСТЫЙ БАЛАНС**
- ◆ **УЛУЧШАЕТ ПОЧЕЧНЫЙ КРОВТОК И СКФ**

ДОЗИРОВКА

ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ: 1 ФЛАКОН

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ: 1-2 БУТЫЛКИ

В ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ

ЭНТРОМИН-SN[®] 200мг
ЧИСТЫЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ НЕЗАМЕНИМЫЕ И ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ С КСИЛИТОЛОМ

**АМИНОКИСЛОТНАЯ
ИНФУЗИЯ**



ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ ДЛЯ ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ С ТПН И ХБП



МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ЭФФЕКТЕ ИНФУЗИИ АМИНОКИСЛОТ ВО ВРЕМЯ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ПАЦИЕНТОВ В ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ.

"Недоедание, по-видимому, влияет на результаты лечения пациентов и связано с более высоким уровнем осложнений, увеличением смертности, увеличением продолжительности пребывания в больнице и увеличением расходов на лечение. В соответствии с руководящими принципами Европейского общества клинического питания и обмена веществ (ESPEN) 2019 года, все тяжелобольные пациенты, находящиеся в отделении интенсивной терапии более 48 часов, должны рассматриваться как подверженные риску недоедания, и всем пациентам, находящимся в отделении интенсивной терапии, следует назначать диетотерапию" (Клиническое испытание 2019)

"Метаболизм аминокислот и белков изменяется, когда человеческий организм сталкивается со стрессом, таким как сепсис, травма или серьезная операция. В таких клинических условиях белково-энергетическая недостаточность приводит к увеличению смертности и ряду других негативных факторов, влияющих на пребывание в больнице и долгосрочные результаты". (Журнал многопрофильного здравоохранения 2021) "Сев

"Несколько исследований продемонстрировали корреляцию между низким потреблением белка в отделении интенсивной терапии и плохими результатами, что делает Аминокислотные добавки - привлекательная терапия" (Интенсивная терапия 2017)

"Внутривенная инфузия аминокислот улучшила баланс чистого белка во всем организме у пациентов в критическом состоянии" (Интенсивная терапия 2017)

"Умеренная гипотермия во время общей анестезии может привести к неблагоприятным клиническим исходам. Периоперационная инфузия аминокислот предотвращает гипотермию во время общей анестезии от стимулирования расхода энергии в состоянии покоя и увеличения скорости метаболизма до уровней, превышающих базовое состояние" (Анестезиологическая клиническая фармакология 2017)



1. Siripurapu et al. Prespektive in medical research 2015:3, 1-5.

2. Int J reported Contracept obstet gynecol. 2016 aug;5(8):2804-2809

3. Int J Biol Med Res. 2011;2(4):1078-1083

*AFI - Amniotic Fluid Index

**РАЗРАБОТАН ПОД ТЕХНИЧЕСКИМ
РУКОВОДСТВОМ ИЗ ЯПОНИИ**



+998 55 501 00 36

МЕТΑΜΕД
NEW IDEAS FOR THE CURE